

OFERTA TARGOWA PET EXPO 2024

**WSZYSTKIE
MOKRE KARMY RAW PALEO**



przy zamówieniu min. 500zł netto

DODATKOWE 10% RABATU

*Promocja łączy się z rabatem Klienta. Promocja obowiązuje w dniach 6-20 września 2024. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów partii promocyjnej

OFERTA TARGOWA PET EXPO 2024

**RAW[®]
PALEO**
V⁺VET EXPERT



opracowane
NAUKOWO

1+1

przy zamówieniu min. 300zł netto

**Do każdego dużego opakowania RAW PALEO (8kg i 10kg)
WYBRANE RAW PALEO ULTRA 750G ZA 1 GROSZ!**

RAW PALEO ULTRA
BEEF MINI PUPPY 750G
RPUBMIPUP750

RAW PALEO ULTRA
BEEF MINI ADULT 750G
RPUBMIADU750

RAW PALEO ULTRA
TURKEY MINI ADULT 750G
RPUTMIADU750

RAW PALEO ULTRA
TURKEY MINI PUPPY 750G
RPUTMIPUP750

*promocja 1+1 łączy się z rabatem Klienta. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Promocja obowiązuje w dniach 6-20 września 2024. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów partii promocyjnej.

OFERTA TARGOWA PET EXPO 2024



przy zamówieniu min. 300zł netto

DODATKOWE 10% RABATU

SPORT MINI TRENERKI
O SMAKU MIĘTOWYM 150G
BSP-06-6847

SPORT MINI TRENERKI
O SMAKU ŁOSOŚIA 150G
BSP-06-6823

SPORT MINI TRENERKI
O SMAKU DZICZYNY I DROBIU
150G BSP-06-6809

SPORT MINI TRENERKI
MIX SMAKÓW 150G
BSP-06-6793

SPORT MINI TRENERKI
O SMAKU JĄGNIĘCINY 150G
BSP-06-6816

SPORT MINI TRENERKI
MIX SMAKÓW 500G
BSP-06-6830

SPORT MAXI TRENERKI
O SMAKU KURCZAKA 500G
BSP-06-6762

SPORT MAXI TRENERKI
O SMAKU JĄGNIĘCINY 500G
BSP-06-6786

SPORT MAXI TRENERKI
O SMAKU WOŁOWINY 500G
BSP-06-6779

SPORT EXTRA TRENERKI
Z KACZKĄ 150G
BSP-06-6854

SPORT EXTRA TRENERKI
Z JĄGNIĘCINĄ 150G
BSP-06-6861

SPORT EXTRA TRENERKI
Z KRÓLIKIEM 150G
BSP-06-6878

SPORT EXTRA TRENERKI
Z DZICZYZNĄ 150G
BSP-06-9442

SPORT EXTRA TRENERKI
Z GĘSIĄ 150G
BSP-06-9435

SPORT EXTRA TRENERKI
ZE STRUSIEM 150G
BSP-06-9428

SPORT EXTRA TRENERKI
Z RYBĄ 150G
BSP-06-6885

* promocja nie łączy się z rabatem Klienta. Cena 1 grosz obowiązuje na najtańsze wybrane produkty. Promocja obowiązuje w dniach 6-20 września 2024. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów partii promocyjnej.

OFERTA TARGOWA PET EXPO 2024



**FOR
GANGSTA
KITTIES!**



DODATKOWY
RABAT

15%

przy zamówieniu min. 300zł netto

DODATKOWE 15% RABATU

CREAMY MOUSSE
KURCZAK I KREWETKI
MBC-01-9718

CREAMY MOUSSE
KURCZAK
MBC-01-9688

CREAMY MOUSSE
ŁOSOŚ
MBC-01-9701

CREAMY MOUSSE
TUŃCZYK
MBC-01-9695

CRUNCHY POCKETS
Z ŁOSOSIEM
MBC-01-9763

CRUNCHY POCKETS
Z TUŃCZYKIEM I KREWETKAMI
MBC-01-9787

CRUNCHY POCKETS
Z TUŃCZYKIEM
MBC-01-9770

CRUNCHY POCKETS
Z TUŃCZYKIEM I KURCZAKIEM
MBC-01-9794

JUICY ROLLS
Z ŁOSOSIEM
MBC-01-9725

JUICY ROLLS
Z TUŃCZYKIEM
MBC-01-9756

JUICY ROLLS
Z WOŁOWINĄ
MBC-01-9749

JUICY ROLLS
Z ŻÓŁTKIEM
MBC-01-9732

PURE FILLETS
GOTOWANY TUŃCZYK
MBC-01-9817

PURE FILLETS
GRILLOWANY KURCZAK
MBC-01-9831

PURE FILLETS
KURCZAK+ WĘDZONA RYBA
MBC-01-9824

PURE FILLETS
PIERŚ KURCZAKA
MBC-01-9800

* promocja łączy się z rabatem Klienta. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów partii promocyjnej. Promocja obowiązuje w dniach 6-20 września 2024. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów partii promocyjnej.

OFERTA TARGOWA PET EXPO 2024



**NA WSZYSTKIE SUPLEMENTY I KOSMETYKI
VET EXPERT RABAT 35%**

* promocja nie łączy się z rabatem Klienta. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów partii promocyjnej.
Promocja obowiązuje w dniach 6-20 września 2024. Promocja obowiązuje do wyczerpania
zapasów partii promocyjnej.

OFERTA TARGOWA PET EXPO 2024

Biopronil



PSY 2-10 kg

**Biopronil
spot-on 67 mg**

roztwór do nakrapiania
dla psów



PSY 11-20 kg

**Biopronil
spot-on 134 mg**

roztwór do nakrapiania
dla psów



PSY 21-40 kg

**Biopronil
spot-on 268 mg**

roztwór do nakrapiania
dla psów



PSY 41-60 kg

**Biopronil
spot-on 402 mg**

roztwór do nakrapiania
dla psów



Każde opakowanie zawiera 3 pipety Biopronil

3+1 MIKSUJ DOWOLNIE!

*promocja niełączy się z rabatem Klienta. Promocja obowiązuje w dniach 6-20 września 2024.
Obowiązuje tylko w sprzedaży bezpośredniej z Vet Planet. Promocja obowiązuje
do wyczerpania zapasów partii promocyjnej.

BIOPRONIL SPOT-ON 67 MG ROZTWÓR DO NAKRAPIANIA DLA PSÓW O MASIE CIAŁA OD 2 DO 10 KG

BIOPRONIL SPOT-ON 134 MG ROZTWÓR DO NAKRAPIANIA DLA PSÓW O MASIE CIAŁA OD 11 DO 20 KG

BIOPRONIL SPOT-ON 268 MG ROZTWÓR DO NAKRAPIANIA DLA PSÓW O MASIE CIAŁA OD 21 DO 40 KG

BIOPRONIL SPOT-ON 402 MG ROZTWÓR DO NAKRAPIANIA DLA PSÓW O MASIE CIAŁA OD 41 DO 60 KG

Skład jakościowy i ilościowy:

Wielkość pipetki	Substancja czynna	Substancje pomocnicze
1 pipetka 0,67 ml	Fipronil – 67 mg	Butylohydroksyzanizol (E 320) – 0,134 mg, Butylohydroksytoulen (E321) – 0,067 mg
1 pipetka 1,34 ml	Fipronil – 134 mg	Butylohydroksyzanizol (E 320) – 0,268 mg, Butylohydroksytoulen (E321) – 0,134 mg
1 pipetka 2,68 ml	Fipronil – 268 mg	Butylohydroksyzanizol (E 320) – 0,536 mg, Butylohydroksytoulen (E321) – 0,268 mg
1 pipetka 4,02 ml	Fipronil – 402 mg	Butylohydroksyzanizol (E 320) – 0,804 mg, Butylohydroksytoulen (E321) – 0,402 mg

Postać farmaceutyczna: roztwór do nakrapiania, klarowny roztwór o charakterystycznym zapachu. **Docelowe gatunki zwierząt:** Pies. **Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt:** Zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides* spp.), kleszczy (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) oraz wszów (*Trichodectes canis*) u psów. Produkt jest stosowany jako element strategii zapobiegania występowaniu alergicznego pchłego zapalenia skóry (APZS), babszyczo, borelioz, erlichiozy granulocytarnej oraz zwałczania zakażenia tasielem *Dipylidium caninum* u psów. Pojedyncza dawka produktu zapewnia ochronę przed ponowną inwazją pcheł i wszów przez okres do 8 tygodni oraz przed ponowną inwazją kleszczy przez okres do 4 tygodni. Zabicie i odpadnięcie obecných w trakcie podawania produktu kleszczy od psa następuje w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu produktu. Nowo atakujące kleszcze będą zabite i odpadną od psa w 48 godzin, dlatego nie jest wykluczone, że na psie mogą znajdować się pojedyncze osobniki. **Przeciwwskazania:** Nie stosować u szczeniąt poniżej 2. miesiąca życia i (lub) o wadze poniżej 2 kg. Nie stosować u zwierząt chorych i w czasie rekonwalescencji. Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u kotów i królików. **Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:** Badania stabilności produktu po kontakcie z wodą nie były prowadzone. Nie zaleca się kąpienia psów na 3 dni przed podaniem produktu. Po jego zastosowaniu nie zaleca się częstych kąpieli w zbiornikach wodnych lub mycia z użyciem szamponu, ponieważ może to wpłynąć na skuteczność produktu. W miejscu podania sierść może być wilgotna, tusta lub może pojawiać się biały nalot. Zmiany te ustępują do 24 godzin po podaniu produktu. Jeśli produkt został zastosowany przed ekspozycją na kleszcze, kleszcze będą zabite w ciągu pierwszych 24-48 godzin od momentu przyczepienia. Do zabicia zwykle dochodzi wcześniej niż czas potrzebny do pełnego wstąpienia się kleszcza w skórę, co minimalizuje, choć nie wyklucza, ryzyka transmisji chorób zakaźnych. Po zabiciu kleszczy zwłazki spadają z ciała zwierzęcia, ale te które pozostała mogą być łatwo usunięte przez delikatne strzepnięcie. Produkt nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do ciała zwierzęcia. Pchły oraz ich postacie rozwojowe występują w otoczeniu zwierząt (legowiska, budy, dywany, tapicerka mebli). Miejsca te powinny być poddawane regularnemu czyszczeniu (np. za pomocą odkurzacza) i działaniu odpowiednich produktów owadobójczych. Gdy produkt jest stosowany jako element strategii zwalczania alergicznego pchłego zapalenia skóry, zaleca się stosowanie produktu raz w miesiącu u zwierząt wrażliwych i innych psów i kotów przebywających w domu. Dla optymalnego zwalczania infestacji pcheł w domu, gdzie przebywa wiele zwierząt, u wszystkich psów i kotów powinien być stosowany odpowiedni produkt owadobójczy. **Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania.** **Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:** Zwierzęta powinny być wazone przed zastosowaniem produktu. Produkt należy nakładać w miejscu, z którego zwierzę nie może go zrzucić. Należy ponadto uniemożliwić wzajemne wylizywanie się zwierząt poddanych zabiegowi. Nie stosować produktu na rany lub uszkodzoną skórę. Psy nie powinny wchodzić do cioków i (lub) zbiorników wodnych przez 2 dni od podania produktu (patrz punkt Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nieżywanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów). **Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:** Osoby o znanej nadwrażliwości na fipronil, inne pochodne fenylpirazolu lub substancje pomocnicze produktu: Butylohydroksyzanizol (E 320), Butylohydroksytoulen (E 321), Alkohol benzylowy, Glikol dietylenowy monoetylu eter powinny unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Kobiety w ciąży powinny unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Należy unikać dotykania, głaskania i pocierania sierści w miejscu podania w ciągu 24 godzin od podania produktu. W tym okresie psy nie powinny spać z ludźmi. W tym okresie należy szczególnie ograniczyć kontakt dzieci z leczonymi zwierzętami. W przypadku dostania się produktu do oka, natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Po przypadkowym kontakcie produktu ze skórą umyć miejsce kontaktu mydłem i wodą. Nie palić, nie jeść, nie pić w trakcie podawania produktu. Podczas podawania produktu należy zastosować rękawiczki jednorazowego użytku. Umyć ręce po zastosowaniu produktu. W przypadku pojawienia się objawów podrażnienia takich jak zaczerwienienie skóry, oka, należy udać się do lekarza i pokazać mu ulotkę informacyjną dołączone do opakowania. **Działania niepożądane (częstość i stopień nasilenia):** W przypadku złizania produktu przez zwierzę może wystąpić przejściowy ślinotok, wymioty, świąd, objawy neurologiczne takie jak: przeczulica, odwracanie głowy, objawy nerwowe. W miejscu podania produktu mogą wystąpić odbarwienia, złepianie i utłuszczenie sierści. Objawy mijają w ciągu 24 godzin. **Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności:** Bezpieczeństwo produktu nie było badane u suk ciężarnych, w laktacji i u zwierząt hodowlanych, jednak laboratoryjne badania bezpieczeństwa nie wskazują, aby produkt miał wpływ na rozród lub rozwój płodów. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny stosunku korzyści do ryzyka wynikających ze stosowania produktu. **Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:** Piperylobutoksyd (należący do pestycydów) działa jako antagonistą fipronilu w zakresie działania przeciw pasożytniczym, ponieważ blokuje utlenianie fipronilu do sulfonów. **Dawkowanie i droga (i) podania:** Droga podania: Podanie przez nakrapianie. Produkt do podawania zewnętrznego, bezpośrednio na skórę.

1 pipetka 0,67 ml	Fipronil – 67 mg	Od 2 do 10 kg
1 pipetka 1,34 ml	Fipronil – 134 mg	Od 11 do 20 kg
1 pipetka 2,68 ml	Fipronil – 268 mg	Od 21 do 40 kg
1 pipetka 4,02 ml	Fipronil – 402 mg	Od 41 do 60 kg

W ten sposób podana zostanie minimalna zalecana dawka fipronilu wynosząca 6,7 mg/kg m.c. **Sposób podania:** Produkt należy nakropić na skórę psa między łopatkami tak, aby uniemożliwić zlizanie produktu. W celu nakrapiania na skórę psa należy wyjąć pipetkę z opakowania, odgarnąć sierść, przyłożyć do skóry i odłamać końcówkę. Następnie, trzymając pipetkę pionowo, wycisnąć całość roztworu z opakowania bezpośrednio na skórę. Nie należy wcierać roztworu. Dotarcie produktu do wszystkich partii ciała następuje w ciągu 24-48 godzin. Odstęp pomiędzy kolejnymi podaniami produktu powinien wynosić nie mniej niż 4 tygodnie. **Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne:** U kilku psów, którym podawano fipronil w dawce 37,5 mg/kg m.c. w 3 godzinę po zastosowaniu, wystąpiły przemiennie łagodne objawy neurologiczne (niewielki bezwład i chwiejność). U psów, którym podawano fipronil w dawce 62,5 mg/kg wystąpiły przemiennie objawy takie jak: drżenie, ataksja, przyspieszony oddech i drgawki, objawy te ustąpiły po 18 godzinach. U psów, którym podawano fipronil w dawce 125 mg/kg zostały zaobserwowane wymioty, brak apetytu, spadek masy ciała, drżenia mięśni, chwiejność, trudności z oddychaniem; objawy minęły po 48 godzinach. **Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nieżywanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów:** Produkt nie powinien przedostawać się do cioków i (lub) zbiorników wodnych, ponieważ jest niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. **Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:** Biowet Drwalessp. z o.o., ul. Grójce 6, o.o., ul. Grójce 6, Drwalessp. **Nazwa i adres dystrybutora:** Vet Planet, ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łoniewo. **Numer (-y) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** 3214/22, 3215/22, 3216/22, 3217/22. Pełna informacja o leku Biopronil na stronie www.leki.vetplanet.pl. Data opracowania materiału reklamowego: styczeń 2024.

